

Акт-ХИБ - вакцина для профилактики менингита, септицемии, эпиглотита и других заболеваний, вызываемых *Haemophilus influenzae* тип В.

Показания

Акт-ХИБ является вакциной и показан для использования у детей, начиная с 2-х месячного возраста. Препарат предназначен для профилактики менингита, септицемии, эпиглотита и других заболеваний, вызываемых *Haemophilus influenzae* тип В. Данная вакцина не индуцирует иммунитет против инфекций, вызываемых другими патогенными агентами, а также против менингитов другой этиологии.

Противопоказания

Данная вакцина не должна вводиться в случае:

- гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины, особенно к столбнячному анатоксину;
- необходимо проинформировать врача о беременности или грудном вскармливании.

Предостережения

Введение данного препарата (как и любой другой вакцины) не рекомендуется проводить при повышенной температуре тела и острых инфекционных заболеваниях. Если вакцина Акт-ХИБ используется одновременно с вакциной против кори, паротита и краснухи оба препарата должны вводиться в разные участки тела.

Дозировка и способ введения

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРЕДПИСАНИЯ ВАШЕГО ВРАЧА.

Растворить лиофилизат, используя шприц с растворителем (4% раствор хлорида натрия) или шприц, содержащий одну дозу вакцины Д.Т.КОК (адсорбированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша) или ТЕТРАКОК (адсорбированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита).

Взболтать до полного растворения лиофилизата. Полученная суспензия может быть мутной или иметь беловатый оттенок.

Вакцина вводится внутримышечно или подкожно.

У детей в возрасте до 2-х лет введение вакцины осуществляется в переднелатеральную область бедра (в среднюю треть).

У детей старше 2-х лет введение вакцины осуществляется в область дельтовидной мышцы.

Перед проведением вакцинации убедиться, что игла не проникла в сосуд. Не вводить внутривенно.

Дозировка

- Для возрастной группы до 6-ти месяцев: 3 инъекции с интервалом в 1-2 месяца с введением ревакцинирующей дозы через год после 3-й инъекции (т.е. в соответствии с официальным календарем вакцинопрофилактики дифтерии, столбняка и полиомиелита).

- У детей в возрасте от 6 до 12 месяцев: 2 инъекции с интервалом в 1 месяц, с введением ревакцинирующей дозы в возрасте 18 месяцев.

- При использовании вакцины у детей в возрасте от 1 года до 5 лет: однократная инъекция.

Побочные реакции

Как и в случае использования любого активного препарата.
При использовании данной вакцины возможно развитие умеренных и преходящих побочных реакций различной степени выраженности.